

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»
от « ____ » _____ 20__ г.
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
гомеопатического лекарственного препарата (Листок-вкладыш)**

Торговое наименование

Лимфомиозот® Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Капли для приема внутрь, 30 мл

Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.

Код АТХ V03AX

Показания к применению

Поддержание лимфатической системы при инфекциях, связанных с увеличением лимфатических узлов; и в качестве поддерживающей терапии при легкой форме удержания жидкости в организме, сопровождаемой отеком конечностей.

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Ни одного случая взаимодействия с другими лекарственными препаратами не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

Специальные предупреждения

Лимфомиозот® Н содержит 35 об. % этанола, то есть до 138 мг на дозу (из 10 капель). Противопоказан лицам страдающим алкоголизмом. Также это

следует принимать во внимание беременным или кормящим женщинам, детям и пациентам с заболеваниями печени или эпилепсией.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, вы должны проконсультироваться с врачом или профессиональным медицинским работником.

Во время беременности или лактации

Не изучена токсичность гомеопатически разведенных веществ входящих в состав препарата при беременности и грудном вскармливании. Необходимо проконсультироваться с врачом перед применением во время беременности и грудного вскармливания.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами, но следует учесть, что Лимфомиозот® Н содержит в составе этанол.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Стандартная дозировка:

Взрослые (и дети старше 12 лет):

10 капель 3 раза в день.

В педиатрии:

Новорожденные (грудные) дети и дети до 2-х лет: по 3 капли 3 раза в день.

2-5 лет: по 5 капель 3 раза в день.

6-11 лет: по 7 капель 3 раза в день.

Первоначальная дозировка при остром состоянии:

Взрослым (и дети старше 12 лет): по 10 капель каждые 30 мин. – 1 час, не более 12 раз в день, затем продолжить в стандартной дозировке.

В педиатрии:

Новорожденные (грудные) дети и дети до 2-х лет: по 3 капли каждые 30 мин. – 1 час, не более 12 раз в день, затем продолжить в стандартной дозировке.

2-5 лет: по 5 капель каждые 30 мин. – 1 час, не более 12 раз в день, затем продолжить в стандартной дозировке.

6-11 лет: по 7 капель каждые 30 мин. – 1 час, не более 12 раз в день, затем продолжить в стандартной дозировке.

Курс лечения - 2-5 недель.

Метод и путь введения

Препарат следует принимать в промежутках между приемами пищи. Для детей добавьте капли в небольшое количество воды.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Ни одного случая передозировки не зарегистрировано и не ожидается в связи с гомеопатическим разведением.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Если у вас есть какие-либо вопросы по использованию данного препарата, спросите своего врача или медицинского работника.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Аллергия (гиперчувствительность) возможна в крайне редких случаях. В отдельных случаях сообщалось о появляющихся кожных реакциях.

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 г препарата содержит

активные вещества:

Araneus diadematus D6	5.0 г
Calcium phosphoricum D12	5.0 г
Equisetum hiemale D4	5.0 г
Ferrum iodatum D12	10.0 г
Fumaria officinalis D4	5.0 г
Gentiana lutea D5	5.0 г
Geranium robertianum D4	10.0 г
Levothyroxinum D12	5.0 г
Myosotis arvensis D3	5.0 г
Nasturtium officinale D4	10.0 г
Natrium sulfuricum D4	5.0 г
Pinus silvestris D4	5.0 г
Scrophularia nodosa D3	5.0 г
Smilax D6	5.0 г
Teucrium scorodonia D3	5.0 г
Veronica officinalis D3	5.0 г

вспомогательные вещества: вода очищенная, этанол 96 % (35 % (об/об) или 29.0 % (м/м)).

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Прозрачный раствор от слегка светло-желтого до светло-желтого цвета, с запахом этанола.

Форма выпуска и упаковка

По 30 мл во флаконы коричневого стекла с полиэтиленовой капельницей-вставкой и полипропиленовой крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тел.: +49 7221 501-00

Факс: +49 7221 501-210

Эл. почта: info@heel.com

Держатель регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тел.: +49 7221 501-00

Факс: +49 7221 501-210

Эл. почта: info@heel.com

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «GO PHARM»

050040, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103

Эл. почта: aemservices@mail.ru

Тел.: +7 707 798 83 99