

## **УТВЕРЖДЕНА**

Приказом Председателя  
РГУ «Комитет медицинского и  
фармацевтического контроля  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г  
№ \_\_\_\_\_

### **Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)**

#### **Торговое наименование**

Бороментол

#### **Международное непатентованное название**

Нет

#### **Лекарственная форма, дозировка**

Мазь для наружного применения 25 г

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Костно-мышечная система. Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли. Препараты для местного применения при суставной и мышечной боли другие.

Код АТХ M02AX

#### **Показания к применению**

В составе комплексной терапии при следующих состояниях:

- зуд кожи
- невралгии
- риниты

#### **Перечень сведений, необходимых до начала применения**

##### ***Противопоказания***

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- нарушения функции почек
- беременность и период лактации
- детский возраст до 12 лет

#### ***Необходимые меры предосторожности при применении***

Не допускать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

#### ***Взаимодействия с другими лекарственными препаратами***

Не установлены

### ***Специальные предупреждения***

Не рекомендуется наносить препарат на обширные участки кожи. Не применять при острых воспалительных кожных заболеваниях.

### ***Применение в педиатрии***

Применение лекарственного препарата у детей до 12 лет противопоказано.

### ***Во время беременности или лактации***

В период беременности или кормления грудью препарат противопоказано.

***Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами***

Не влияет

### **Рекомендации по применению**

#### ***Метод и путь введения***

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи. При ринитах смазывают кожу крыльев носа и легко втирают.

#### ***Длительность лечения***

Курс лечения 3-5 дней.

#### ***Меры, которые необходимо принять в случае передозировки***

Симптомы – тошнота, рвота, диарея, сыпь, головная боль, спутанность сознания, судороги.

Лечение – симптоматическое.

#### ***Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата***

Не рекомендуется применять длительно препарат без консультации врача.

### **Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае**

- возможны аллергические реакции, контактный дерматит

**При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов**

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» «Комитет медицинского и фармацевтического контроля» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

### **Дополнительные сведения**

#### ***Состав лекарственного препарата***

100 г препарата содержит

*активные вещества* - кислота борная 3.0 г; ментол 0.5 г  
*вспомогательное вещество*- вазелин до 100.0 г

### **Описание внешнего вида, запаха, вкуса**

Мазь белого или светло-желтого цвета с запахом ментола.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 25 г в банки из стекломассы с винтовой горловиной, крышка полиэтиленовая навинчиваемая с уплотняющим элементом.

На банки наклеивают самоклеющиеся этикетки или этикетки из бумаги этикеточной или писчей.

Банки вместе с инструкциями по медицинскому применению на казахском и русском языках в соответствующем количестве укладывают в стопы из бумаги оберточной или в коробку из картона коробочного или пленку полиэтиленовую термоусадочную или ящики из гофрированного картона.

По 25 г в тубы из комбинированного материала для лекарственных средств.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Тубы без вторичной упаковки вместе с инструкциями по медицинскому применению на казахском и русском языках в соответствующем количестве укладывают в стопы из бумаги оберточной или в коробку из картона коробочного или пленку полиэтиленовую термоусадочную или ящики из гофрированного картона.

### **Срок хранения**

2 года

Не применять по истечении срока годности!

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Сведения о производителе**

ТОО «Фармация 2010», РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-н им.

Казыбек Би, ул. Чкалова, стр. 7А, тел. 8 (7212) 42-67-34

e-mail: [farmaciya2010@mail.ru](mailto:farmaciya2010@mail.ru)

### **Держатель регистрационного удостоверения**

ТОО «Фармация 2010», РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-н им.

Казыбек Би, ул. Чкалова, стр. 7А, тел. 8 (7212) 42-67-34

e-mail: [farmaciyakrg@mail.ru](mailto:farmaciyakrg@mail.ru)

**Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства**

ТОО «Фармация 2010», РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Чкалова, стр. 7А, тел. 8 (7212) 42-67-34

e-mail: [farmaciyakrg@mail.ru](mailto:farmaciyakrg@mail.ru)