

Қосымша парақ – Пациентке арналған ақпарат

Гербион® исландия мүгі, соруға арналған таблеткалар

Әсер етуші зат: Исланд мүгінің құрғақ экстрактісі

Препаратты қолданар алдында қосымша парақты толық оқып шығыңыз, себебі онда Сіз үшін маңызды мәліметтер бар.

Препаратты үнемі қосымша парақпен немесе емдеуші дәрігердің немесе дәріхана қызметкерінің нұсқауларымен дәлме-дәл қабылдаңыз.

Қосымша парақты сақтаңыз. Сізге оны тағы бір рет оқып шығу қажет болуы мүмкін.

Егер Сізге қосымша мәліметтер немесе нұсқаулар керек болса, дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар пайда болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз. Осындай нұсқау кез келген болуы мүмкін, оның ішінде қосымша парақтың 4 бөлімінде атап көрсетілмеген жағымсыз реакцияларға да қатысты болады.

Егер жай-күй жақсармаса немесе ол 7-14 күн өткен соң нашарлап кетсе, Сізге дәрігерге қаралу керек.

ҚОСЫМША ПАРАҚ МАЗМҰНЫ

1. Гербион® исландия мүгі препараты қандай түрде болады және оны не үшін қолданады.
2. Гербион® исландия мүгі препаратын қолданар алдында не туралы білу керек.
3. Гербион® исландия мүгі препаратын қолдану.
4. Болуы мүмкін жағымсыз реакциялар.
5. Гербион® исландия мүгі препаратын сақтау.
6. Қаптаманың ішіндегісі және басқа да мәліметтер.

1. ГЕРБИОН® ИСЛАНДИЯ МҮГІ ПРЕПАРАТЫ ҚАНДАЙ ТҮРДЕ БОЛАДЫ ЖӘНЕ ОНЫ НЕ ҮШІН ҚОЛДАНАДЫ

Респираторлық жүйе. Жөтелге қарсы препараттар және суық тию ауруларын емдеуге арналған дәрілер. Жөтелге қарсы препараттар, қақырық түсіретін дәрілермен біріктірілімдерін қоса. Жөтелге қарсы басқа препараттар.

АТХ коды R05DB.

Қолданылуы

Гербион® исландия мүгінің құрамында исланд мүгінің құрғақ экстрактісі бар. Осы өсімдік тектес препарат:

- ауыз қуысының және жұтқыншақтың шырышты қабығын тітіркендіргенде, құрғақ жөтелде

- тамақтың қарлығуы мен ауыруын жеңілдету үшін қолданылады.

Гербион® исландия мүгінің құрамында мукополисахаридтердің көп мөлшері бар, олар ауыз қуысы мен тамақтың шырышты қабығын жабындайды, қорғайды және ылғалдандырады, сол арқылы тітіркену мен құрғақ жөтелді басады деп саналады.

Егер жақсару басталмаса немесе Сіз 7-14 күн өткен соң нашарлау сезінсеңіз, емдеуші дәрігерге қаралу қажет.

2. ГЕРБИОН® ИСЛАНДИЯ МҮГІ ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НЕ ТУРАЛЫ БІЛУ КЕРЕК

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Гербион® исландия мүгі препаратын қолданбаңыз:

- егер Сізде исланд мүгінің экстрактісіне немесе препараттың кез келген басқа (қосымша парақтың 6 бөлімінде атап көрсетілген) компоненттеріне аллергия болса
- 12 жасқа дейінгі балаларда
- егер Сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз
- егер Сізде тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы болса.

Айрықша нұсқаулар және сақтандыру шаралары

Гербион® исландия мүгін қолданар алдында келесі жағдайларда емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз:

- тыныс тарылуымен, дене температурасының көтерілуімен, созылмалы жөтелмен немесе қан аралас қақырық бөлінуімен болатын тыныс жолдарының ауруларында дәрігердің шұғыл қарап тексеруі қажет.
- егер Сіздің жай-күйіңіз препаратты қолдану басталғаннан кейін 7-14 күн өткен соң жақсармаса, дәрігерге қаралу керек.

Балалар

Соруға арналған таблеткалар дәрілік түріндегі Гербион® исландия мүгі препараты 12 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілімді, өйткені аталған дәрілік түр дозаны дұрыс таңдау мүмкіндігін бермейді. 12 жасқа дейінгі балаларға Гербион® исландия мүгі шәрбаты препаратын қабылдауға кеңес беріледі.

Басқа препараттар және Гербион® исландия мүгі препараты

Сіздің қандай да бір басқа дәрілік препараттарды қабылдап жүргеніңіз, таяуда қабылдағаныңыз немесе қабылдай бастауыңыз мүмкін екенін емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне мәлімдеңіз.

Гербион® исландия мүгінің басқа дәрілік препараттар әсерлеріне ықпал ететіні туралы хабарламалар тіркелмеген.

Гербион® исландия мүгі препараты тағаммен және сусындармен

Соруға арналған таблеткаларды қабылдаудан кейін бірден тағам жеуге немесе сусындар ішуге болмайды, өйткені бұл препараттың ауыз қуысы мен тамақтың шырышты қабығынан шығарылуын жеделдетуі мүмкін. Дегенмен де, емдеу кезінде көп мөлшерде шай немесе жылы сұйықтық ішуге кеңес беріледі, бірақ препаратты қабылдаудан кейін бірден емес.

Жүктілік және бала емізу

Егер Сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз, жүкті болып қалдым деп ойласаңыз немесе бала көтеруді жоспарласаңыз, препаратты қолдануды бастар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз.

Гербион® исландия мүгі аталған қауымда исланд мүгі экстрактісін қолдану жөніндегі деректер жеткіліксіздігіне байланысты жүкті әйелдерде және лактация кезеңінде қолдануға ұсынылмаған.

Көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу

Препаратты қолдану көлік құралдарын басқару және қауіптілігі зор механизмдермен жұмыс істеу қабілетіне әсер етпейді.

Гербион® исландия мүгі құрамында изомальт (E953) және бутилгидроксианизол (E320) бар.

Егер Сізде кейбір қанттар жақпаушылығы бар болса, осы дәрілік препаратты қабылдамас бұрын дәрігермен кеңесіңіз.

Бутилгидроксианизол (E320) терінің жергілікті реакцияларын (мысалы, жанаспалы дерматит) немесе көздің және шырышты қабықтардың тітіркенуін тудыруы мүмкін.

3. ГЕРБИОН® ИСЛАНДИЯ МҮГІ ПРЕПАРАТЫН ҚОЛДАНУ

Препаратты үнемі емдеуші дәрігердің немесе дәріхана қызметкерінің нұсқауларымен толық сәйкестікте қолданыңыз. Күмән пайда болса, емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз.

Ұсынылатын доза:

Ересектерге және 12 жастан үлкен жасөспірімдерге ұсынылатын доза тәулігіне 8 рет соруға арналған 1 таблетканы құрайды (бұл 24 мг исланд мүгінің құрғақ экстрактісіне баламалы).

Қолдану тәсілі

Таблетканы ауызда ерітіңіз.

Препаратты қабылдаудан кейін бірден тағам жеуге немесе сусындар ішуге болмайды, өйткені бұл препараттың ауыз қуысы мен тамақтың шырышты қабығынан шығарылуын жеделдетуі мүмкін. Дегенмен де, емдеу кезінде көп мөлшерде шай немесе жылы сұйықтық ішуге кеңес беріледі, бірақ препаратты қабылдаудан кейін бірден емес.

Емдеу ұзақтығы

Емдеу ұзақтығы аурудың сипаты мен ауырлығына байланысты, сондықтан емдеуді ұзақ уақыт кезеңі бойына (7-14 күн) үздіксіз жалғастыруға болады.

Препаратты қабылдауды клиникалық симптомдар басылған соң бірнеше күн бойы жалғастыруға кеңес беріледі.

Егер Сіз Гербион® исландия мүгі препаратын керектісінен көбірек қабылдап қойсаңыз

Препаратты ұсынылуынан асып кететін дозаларда қолданбаңыз. Артық дозалану жағдайлары хабарланбаған.

Егер Сіз Гербион® исландия мүгін қабылдауды ұмытып кетсеңіз

Препараттың өткізіп алған қабылдауының орнын толтыру үшін екі есе дозасын қабылдамаңыз.

Егер Сіз Гербион® исландия мүгі препаратын қабылдауды тоқтатсаңыз
Өткізіп алған дозаның орнын толтыру үшін екі есе дозасын қабылдамаңыз.

Препаратты қолдану жөнінде сұрақтар болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

4. БОЛУЫ МҮМКІН ЖАҒЫМСЫЗ РЕАКЦИЯЛАР

Барлық дәрілік препарат сияқты, препарат жағымсыз реакциялар туғызуы мүмкін, алайда, олар бәрінде бірдей туындамайды.

Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)

- қышынумен, терінің гиперемиясымен немесе ентігумен көрініс беретін аса жоғары сезімталдық реакциясы.

Жағымсыз реакциялар туралы хабарлау

Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар туындаса, дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз. Осындай нұсқау кез келген болуы мүмкін, оның ішінде қосымша парақта атап көрсетілмеген жағымсыз реакцияларға қатысты болады. Сізге жағымсыз реакциялар жөнінде мүше-мемлекет аумағында анықталған дәрілік препараттар тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, жағымсыз реакциялар бойынша ақпараттық дерекқорға мәлімдеуге де болады. Аталған жағымсыз реакциялар туралы хабарлай отырып, Сіз препарат қауіпсіздігі туралы көбірек мәліметтер алуға көмектесесіз.

Қазақстан Республикасы

010000, Астана қ., Байқоңыр ауданы, А. Иманов көш., 13 үй, «Нұрсәулет 2» БО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және
фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды
сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
Тел.: +7 7172 235 135
Эл. пошта: farm@dari.kz
Веб-сайт: www.ndda.kz

Ресей Федерациясы

109012, Мәскеу қ. Славян алаңы, 4 үй, 1 құр.
Денсаулық сақтау саласын қадағалау жөніндегі федералдық қызмет
Тел.: +7 (800) 550 99 03
Эл. пошта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Веб сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

Беларусь Республикасы

220037, Минск қ., Товарищеский т/к, 2а үй
«Денсаулық сақтау саласындағы сараптамалар мен сынақтар орталығы» республикалық
унитарлық кәсіпорны
Фармакоқадағалау бөлімінің телефоны: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29
Эл. пошта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by
Веб-сайт: www.rceth.by

Армения Республикасы

0051, Ереван қ., Комитас даңғ., 49/4

«Академик Э. Габриелян атындағы Дәрілер мен медициналық технологияларды ғылыми сараптау орталығы»

Тел.: + 374 60 83 00 73

Эл. пошта: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am, letters@pharm.am

Веб-сайт: www.pharm.am

Қырғыз Республикасы

720044, Шу облысы, Бішкек қ., 3-ші линия көш., 25 үй

Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар департаменті

Тел.: + 996 (312) 21 92 86

Эл. пошта: dlsmi@pharm.kg

Веб-сайт: www.pharm.kg

5. ГЕРБИОН® ИСЛАНДИЯ МҮГІ ПРЕПАРАТЫН САҚТАУ

Препаратты бала оны көре алмайтындай балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Препаратты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолданбаңыз.

Жарамдылық мерзімінің өткен күні ағымдағы айдың соңғы күні болып табылады.

Дәрілік препарат арнайы сақтау шарттарын талап етпейді.

Препаратты кәріз жүйесіне тастамаңыз (төкпеңіз). Енді қажет болмайтын препаратты қалай кәдеге жарату (жою) керектігін дәріхана қызметкерінен нақты анықтаңыз. Бұл шаралар қоршаған ортаны қорғауға мүмкіндік береді.

6. ҚАПТАМАНЫҢ ІШІНДЕГІСІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА МӘЛІМЕТТЕР

Гербион® исландия мүгінің құрамында

Әрбір соруға арналған таблетканың құрамында 3 мг экстрактісі (құрғақ экстракт ретінде) *Cetraria Islandica* (L.) Acharius s.l., қатпарлары (90 мг – 120 мг исланд мүгіне баламалы).

Экстракцияға арналған еріткіш: су.

Басқа да ингредиенттер (қосымша заттар): аскорбин қышқылы (E300), маннитол (E421), алма қышқылы (E296), сукралоза (E955), табиғи апельсин хош иістендіргіші, табиғи цитрус хош иістендіргіші (бутилгидроксианизол (E320)), бояғыш куркума майы мен изомальт (E953) бар.

Экстракт құрамында пайдаланылатын қосымша заттар: изомальт (E953) және сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы.

Гербион® исландия мүгі препаратының сыртқы түрі және қаптаманың ішіндегісі

Дөңгелек дерлік пішінді, ойығы мен бұдырлы беткейі бар сарыдан қоңырлау-сары түске дейінгі соруға арналған таблеткалар.

Күңгірттеу бөлшектері, ашықтау дақтары, ауа көпіршіктері және аздап кетілген шеттерінің болуына жол беріледі.

8 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден, полиэтиленнен, поливинилдихлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.

1, 2, 3, 4 немесе 5 пішінді ұяшықты қаптамадан қосымша парақпен бірге картон қорапшаға салынады.

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

«КРКА, д.д., Ново место» АҚ
Шмарьешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения
Тел.: +386 7 331 21 11
Факс: +386 7 332 15 37
Эл. пошта: info@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz

Препарат туралы кез келген ақпарат алу үшін, сондай-ақ шағымдар туындаған жағдайларда тіркеу куәлігін ұстаушының жергілікті өкіліне немесе тіркеу куәлігінің ұстаушысына хабарласу керек:

Казахстан Республикасы

«КРКА Қазақстан» ЖШС
050040, Алматы қ., Шағын ауданы КОКТЕМ-1, үй 15А, офис 601
Тел.: +7 (727) 311 08 09
Эл. пошта: info.kz@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz

Ресей Федерациясы

«КРКА-РУС» ЖШҚ
143500, Мәскеу обл., Истра қ., Московская көш., 50 үй
Тел.: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Эл. пошта: krka-rus@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz

Беларусь Республикасы

«КРКА, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Словения Республикасы) акционерлік қоғамының Беларусь Республикасындағы өкілдігі
220114, Минск қ., Филимонов көш., 25Г үй, 315 кеңсе
Тел.: 8 740 740 92 30
Факс: 8 740 740 92 30
Эл. пошта: info.by@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.by

Армения Республикасы

«Крка, д.д., Ново место» Армения Республикасындағы өкілдігі
0001, Ереван қ., Налбандян көш., 106/1 үй («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС ОРТАЛЫҒЫ), 103 кеңсе
Тел.: + 374 11 56 00 11
Эл. пошта: info@krka.am
Веб-сайт: www.krka.biz

Қырғыз Республикасы

«КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» АҚ Қырғызстандағы өкілдігі
720040, Шу облысы, Бішкек қ., Эркиндик бульвары, 71 үй, А блок
Тел.: + 996 (312) 66 22 50
Эл. пошта: info.kg@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz

Қосымша парақ қайта қаралды

Басқа да ақпарат көздері

Аталған препарат туралы толық мәліметтер Одақ веб-сайтында баяндалады:
<http://ees.eaeunion.org>.

ТІЛІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И ССРЕДЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ

(на 2 листах)

ПАРАК / ЛИСТОВ

КҮНІ / ДАТА

11.06.2015



Листок-вкладыш - Информация для пациента

Гербион® исландский мох, таблетки для рассасывания

Действующее вещество: Сухой экстракт исландского мха

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок - вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 7-14 дней Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Гербион® исландский мох и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гербион® исландский мох.
3. Применение препарата Гербион® исландский мох.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гербион® исландский мох.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГЕРБИОН® ИСЛАНДСКИЙ МОХ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Респираторная система. Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний. Противокашлевые препараты, кроме комбинаций с отхаркивающими средствами. Другие противокашлевые препараты.

Код АТХ R05DB.

Показания к применению

Гербион® исландский мох содержит сухой экстракт исландского мха. Данный препарат растительного происхождения, применяется для облегчения:

- раздражения слизистых оболочек полости рта и глотки, сухом кашле
- осиплости и боли в горле.

Гербион® исландский мох содержит большое количество мукополисахаридов, которые, как считается, покрывают, защищают и увлажняют слизистую оболочку ротовой полости и горла, таким образом устраняя раздражение и сухой кашель.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7-14 дней необходимо обратиться к лечащему врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ИСЛАНДСКИЙ МОХ

Противопоказания

Не применяйте препарат Гербион® исландский мох:

- если у Вас аллергия на экстракт исландского мха или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша)
- у детей в возрасте до 12 лет
- если Вы беременны или кормите грудью
- если у Вас наследственная непереносимость фруктозы.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом применения Гербион® исландский мох проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки в следующих случаях:

- при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся затрудненным дыханием, повышением температуры тела, хроническим кашлем или выделением мокроты с кровью, необходим незамедлительный осмотр врача.
- если Ваше состояние не улучшится через 7-14 дней после начала применения препарата, то следует обратиться к врачу.

Дети

Препарат Гербион® исландский мох в лекарственной форме таблетки для рассасывания противопоказано детям до 12 лет, так как данная лекарственная форма не позволяет корректно провести подбор дозы. Для детей в возрасте до 12 лет рекомендовано принимать препарат Гербион® сироп исландского мха.

Другие препараты и препарат Гербион® исландский мох

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Сообщений о влиянии Гербион® исландский мох на эффекты других лекарственных препаратов не зарегистрировано.

Препарат Гербион® исландский мох с пищей и напитками

Сразу же после приема таблеток для рассасывания не следует употреблять пищу или напитки, поскольку это может ускорить выведение препарата со слизистой оболочки ротовой полости и горла. Тем не менее, во время лечения рекомендуется употреблять большое количество чая или теплой жидкости, но не сразу после приема препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Гербион® исландский мох не рекомендован к применению у беременных и в период лактации в связи с недостаточностью данных по применению экстракта исландского мха у данной популяции.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

Гербион® исландский мох содержит изомальт (E953) и бутилгидроксанизол (E320).

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.

Бутилгидроксанизол (E320) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ИСЛАНДСКИЙ МОХ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Рекомендуемая доза для **взрослых и подростков старше 12 лет** составляет 1 таблетка для рассасывания 8 раз в сутки (что эквивалентно 24 мг сухого экстракта мха исландского).

Способ применения

Растворите таблетку во рту.

Сразу же после приема препарата не следует употреблять пищу или напитки, поскольку это может ускорить выведение препарата со слизистой оболочки ротовой полости и горла. Тем не менее, во время лечения рекомендуется употреблять большое количество чая или теплой жидкости, но не сразу после приема препарата.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания, поэтому лечение может продолжаться непрерывно в течение более длительного периода времени (7-14 дней).

Рекомендуется продолжение приема препарата в течение нескольких дней после исчезновения клинических симптомов.

Если Вы приняли препарата Гербион® исландский мох больше, чем следовало

Не применяйте препарат в дозах, превышающих рекомендованные. О случаях передозировки не сообщалось.

Если Вы забыли принять Гербион® исландский мох

Не принимайте двойную дозировку, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата.

Если Вы прекратили прием препарата Гербион® исландский мох

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

- реакция гиперчувствительности, проявляющаяся зудом, гиперемией кожи или одышкой.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства - члена. Сообщая о данных нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Казахстан

010000, г. Астана район Байконур, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Тел.: + 7 7172 235 135

Адрес эл. почты: farm@dari.kz

Веб-сайт: www.ndda.kz

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Тел.: +7 (800) 550 99 03

Адрес эл. почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Веб сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29

Адрес эл. почты: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

Веб-сайт: www.rceth.by

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/4

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна»

Тел.: + 374 60 83 00 73

Адрес эл. почты: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am, letters@pharm.am

Веб-сайт: www.pharm.am

Кыргызская Республика

720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий

Тел.: + 996 (312) 21 92 86
Адрес эл. почты: dlsmi@pharm.kg
Веб-сайт: www.pharm.kg

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕРБИОН® ИСЛАНДСКИЙ МОХ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Лекарственный препарат не требует специальных условий хранения.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Гербион® исландский мох содержит

Каждая таблетка для рассасывания содержит 3 мг экстракта (в виде сухого экстракта) *Cetraria Islandica* (L.) Acharius s.l., слоевица (эквивалентно 90 мг – 120 мг исландскому мху).

Растворитель для экстракции: вода.

Прочие ингредиенты (вспомогательные вещества): аскорбиновая кислота (E300), маннитол (E421), яблочная кислота (E296), сукралоза (E955), ароматизатор апельсиновый натуральный, ароматизатор цитрусовый натуральный (бутилгидроксанизол (E320)), краситель куркумы масло и изомальт (E953).

Вспомогательные вещества, используемые в составе экстракта: изомальт (E953) и кремния диоксид коллоидный безводный.

Внешний вид препарата Гербион® исландский мох и содержимое упаковки

Почти круглой формы таблетки для рассасывания с фаской и шероховатой поверхностью от желтого до коричневатого-желтого цвета.

Допускается наличие более темных частиц, более светлых пятен, пузырьков воздуха и небольших зазубренных краев.

По 8 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, полиэтилена, пленки поливинилдихлоридной и фольги алюминиевой.

По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем вкладывают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «КРКА, д.д., Ново место»
Шмарьешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения
Тел.: +386 7 331 21 11
Факс: +386 7 332 15 37
Адрес эл. почты: info@krka.biz
Веб-сайт: www.krka.biz

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения

Республика Казахстан

ТОО «КРКА Казахстан»

050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601

Тел.: +7 (727) 311 08 09

Адрес эл. почты: info.kz@krka.biz

Веб-сайт: www.krka.biz

Российская Федерация

ООО «КРКА-РУС»

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

Тел.: +7 (495) 994 70 70

Факс: +7 (495) 994 70 78

Адрес эл. почты: krka-rus@krka.biz

Веб-сайт: www.krka.biz

Республика Беларусь

Представительство Акционерного общества «КРКА, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Республика Словения) в Республике Беларусь

220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25Г, офис 315

Тел.: 8 740 740 92 30

Факс: 8 740 740 92 30

Адрес эл. почты: info.by@krka.biz

Веб-сайт: www.krka.by

Республика Армения

Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения

0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103

Тел.: + 374 11 56 00 11

Адрес эл. почты: info@krka.am

Веб-сайт: www.krka.biz

Кыргызская Республика

Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане

720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А

Тел.: + 996 (312) 66 22 50

Адрес эл. почты: info.kg@krka.biz

Веб-сайт: www.krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
<http://ees.eaeunion.org>.

ТІЛІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И ССРЕДЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ

(на 2 листах)

ПАРАК / ЛИСТОВ

КҮНІ / ДАТА

11.06.2015

